

ADV "TERRA ALTA" Avís nº 02/2016 divendres, 26 / febrer / 2016

Sobre AMETLLER
Són 1 pàgines

| | |
|-----------------|---|
| AMETLLER | ARRUFAT I PERDIGONADA: Varietats en prefloració Sol tenir incidència a l'inici de la brotada si durant aquesta època es produeixen períodes de pluja i molta humitat. Es recomana realitzar un tractament des de l'estadi B (borró inflat) fins a la caiguda dels pètals. |
| | MONILIA: Varietats a inici de floració A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un tractament a inici de floració. En presència d'humitats o pluges cal repetir-lo a plena floració. |
| | PUGÓ VERD: varietats en post floració Així que les varietats més primerenques quedin lliures de les despulles florals o "collarí", i es vegi l'ametlló com l'ungla, es recomana realitzar el seu control. |

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- contestador automàtic: telèfon 977421278 (opció 2)
- web: <http://www.doterraalta.com/ca/serveis/ADV.php>

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / F. 977421623 / info@doterraalta.com

Informació relacionada a:

Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAM](#)