

ADV "TERRA ALTA" Avís nº 22/2016

dimecres, 3 / agost / 2016

Sobre VINYA i OLIVERA
Són 1 pàgines

VINYA	<p style="text-align: center;">CUC DEL RAÏM</p> <p>Zones primerenques de la Terra Alta Camposines, Algars, Corbera i Pinell: El tractament amb un producte larvicida de màxima naixença del tipus Clorpirifos es recomana realitzar-lo a partir de demà dijous, 4 d'agost i fins dissabte, 6 d'agost.</p> <p>Zones mitjanes de la Terra Alta (Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla): ens trobem en període de posta d'ous del vol de 3ª generació i es preveu l'inici d'eclosions per demà dijous, 4 d'agost i fins divendres, 5 d'agost.</p> <p>Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes): ens trobem en període de posta d'ous del vol de 3ª generació.</p> <p>Moments de tractament i productes: Inici de vol: Fenoxicarb Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Indoxacarb, metoxifenocide, clorantraniliprol. Inici d'eclosió: Bacillus thuringiensis, spinosad, emamectina i tebufenocide, Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos</p>
	<p style="text-align: center;">CENDROSA</p> <p>S'observa presència de la malaltia en algunes vinyes. Cal estar atents sobretot en varietats sensibles per renovar la protecció si es detecta presència de la mateixa. Es recorda que el quart tractament contra la malaltia s'ha de realitzar a inici de verolat.</p>
OLIVERA	<p style="text-align: center;">MOSCA DE L'OLIVA</p> <p>Estem en vol de primera generació, de moment els nivells de població són baixos respecte altres anys. Tot i això, en els últims controls realitzats, en tots els punts de control s'observa oliva picada en varietats d'oliva grossa i els índexs d'oliva picada han augmentat. De manera que es va recomanar realitzar un tractament a tot l'arbre amb un producte larvicida a les varietats primerenques d'oliva grossa, Empeltre, Farg, Gordal, Sevillenc, Fulla de Salze, etc, a partir d'avui <u>dimecres, 3 d'agost</u>.</p> <p>Si s'utilitza la captura massiva per al control d'aquesta plaga ja es va recomanar col·locar els mosquers amb anterioritat. També, si es realitza el tractament amb esquer o a la rameta o s'utilitza el caolí com a repel·lent de picada, ja es va recomanar aplicar aquests productes en varietats d'oliva grossa.</p> <p>Pel que fa a l'oliva arbequina, ja es detecta alguna oliva picada però els nivells són molt baixos en tots els punts de control. Per tant, no es recomana realitzar cap tipus de tractament de caràcter general en aquesta varietat. Tant sols, si s'utilitzen els productes preventius com són el caolí, tractaments esquer o la rameta o be Beauveria bessiana, ja es poden aplicar aquests productes en aquesta varietat. S'ha de tenir en compte que per al caolí cal cobrir bé el fruit realitzant dues passades per banda, una en cada direcció.</p>

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- contestador automàtic: telèfon 977421278 (opció 4)
- web: <http://doterraalta.com/advta/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.com

Informació relacionada a:

Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAM](#)